#### ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



### DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets <sup>6</sup> :		(11) Numéro de publication internationale:	WO 99/25374
A61K 38/55 // (A61K 38/55, 31:405)	A1	(43) Date de publication internationale:	27 mai 1999 (27.05.99)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR9 (22) Date de dépôt international: 3 mars 1998 (0	-	US, brevet eurasien (AM, AZ, BY,	KG, KZ, MD, RU, TJ, I, DE, DK, ES, FI, FR,
(30) Données relatives à la priorité: 97/14485 19 novembre 1997 (19.11.97	- 7) I	R Publiée  Avec rapport de recherche internation	onale.
(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): A COMPAGNIE [FR/FR]; 1, rue Carle Hébert, Courbevoie Cedex (FR).	(DIR 1 F-924	15	,
(72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): GUEZ, David 38, avenue du Roule, F-92200 Neuilly sur Sei SCHIAVI, Pierre [FR/FR]; 3, rue des Alouettes, Nanterre (FR). LEVY, Bernard [FR/FR]; 7, rue G F-75010 Paris (FR).	ine (FF F-920	t). 00	•
(74) Représentant commun: ADIR ET COMPAGNIE; 1, Hébert, F-92415 Courbevoie Cedex (FR).	rue Ca	rle	
·			
(54) Title: COMBINATION OF HYPERTENSIN CON	VERT	ING ENZYME INHIBITOR WITH A DIURE	TIC FOR TREATING

- MICROCIRCULATION DISORDERS
- (54) Titre: COMBINAISON D'UN INHIBITEUR DE L'ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE ET D'UN DIURETIQUE POUR LE TRAITEMENT DES DESORDRES MICROCIRCULATOIRES

### (57) Abstract

The invention concerns the use of a combination of the hypertensin converting enzyme inhibitor (IEC) with a diuretic to obtain pharmaceutical compositions for treating arteriolo-capillary microcirculation disorders.

#### (57) Abrégé

La présente invention concerne l'utilisation d'une combinaison d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) et d'un diurétique pour l'obtention de compositions pharmaceutiques destinées au traitement des désordres microcirculatoires artériolo-capillaires.

### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Amrénie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	Prance	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
ΑÜ	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	A zerbaĭdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
ВВ	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Brésil	ΙL	Israël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
СН	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Carée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Pédération de Russie		
DE	Allemagne	IJ	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
EE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		

WO 99/25374 PCT/FR98/00411

COMBINAISON D'UN INHIBITEUR DE L'ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE ET D'UN DIURETIQUE POUR LE TRAITEMENT DES DESORDRES MICROCIRCULATOIRES

La présente invention concerne l'utilisation d'une combinaison d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) et d'un diurétique pour l'obtention de compositions pharmaceutiques destinées au traitement des désordres microcirculatoires artériolo-capillaires.

5

10

15

20

25

On sait que la plupart des maladies vasculaires dégénératives, l'hypertension artérielle par exemple (N.M. KAPLAN, "Microvascular Rarefaction", Clinical Hypertension 6th ed. Baltimore Wilkinson et Wilkins, 1994, 86; A.S. GREENE et coll., "Microvascular rarefaction and tissue vascular resistance in hypertension", Am J. Physiol., 1989, 256 (Heart Circ. Physiol., 25):H 126-H 31; A.S. IZZARD et coll., "Hypertension and the vasculature: arterioles and the myogenic response", J. Hypertens., 1995, 13:1-4; A.M. HEAGERTY et coll., "Small artery structure in hypertension". Hypertension, 1993, 21:391-7), mais aussi les complications vasculaires de certaines maladies métaboliques, le diabète sucré par exemple (G. REACH et coll., "Causes et mécanismes de la microangiopathie et de la neuropathie- "L'hypothèse glucose" et ses implications", In: G. Tchobroutsky, G. Slama, R. Assan, P. Freychet, Paris: Pradel, 1990, 448-57), ou certaines dyslipidémies (J.F. TOOLE, "Atherosclerosis", Cerebrovascular disorders. New York: Raven Press, 1984, 199-213), s'accompagnent d'altérations anatomiques et/ou foncitonnelles de la microcirculation artériolo-capillaire (J.C.M.L. LE NOBLE et coll., "A functional morphometric study of the cremaster muscle microcirculation in young spontaneously hypertensive rats", J. Hypertens., 1990, 8:741-8; I.I.H. CHEN et coll., "Microvascular rarefaction in spontaneously hypertensive rat cremaster muscle", Am. J. Physiol, 1981, 241:H 306-10).

Les altérations anatomiques et/ou fonctionnelles de la microcirculation artériolo-capillaire peuvent prendre différents aspects, comme par exemple :

- une raréfaction artériolo-capillaire (P. GASSER, "Nailfold microcirculation in normotensive and essential hypertensive subjects as assessed by video-microscopy", J. Hypertens., 1992, 1:83-6),

- un défaut de recrutement artériolo-capillaire (B.W. ZWEIFACH, "Micropressure-flow relationships in a skeletal muscle of spontaneously hypertensive rats", Hypertension, 1981, 3:601-14),
- et de façon plus générale, une inadaptation de la distribution du sang dans les tissus en fonction des besoins métaboliques, toute altération susceptible d'induire ou de péréniser une hypoperfusion tissulaire, une ischémie, absolue ou relative (E. VICAUT, "Hypertension and the microcirculation: a brief overview of experimental studies", J. Hypertens., 1992, 10 suppl 5:S59-S68).

On sait également que les altérations anatomiques et/ou fonctionnelles de la microcirculation artériolo-capillaire sus décrites peuvent précéder, par exemple, l'élévation des chiffres tensionnels dans l'hypertension artérielle, créant pour certains un véritable cercle vicieux (A.J. ZWEIFLER et coll., "Diminished finger pulse in borderline hypertension: evidence for early structural vascular abnormality", Am. Heart J., 1982, 104-812-15; J.M. SULLIVAN et coll., "Attenuation of the microcirculation in young pateints with high - output borderline hypertension", Hypertension, 1983, 5:844-51).

10

15

20

25

30

On sait enfin que de très nombreux facteurs sont impliqués à la fois dans la régulation de l'hémodynamique générale (débits, résistances, pressions...) et dans la régulation, ou plutôt l'adaptation, de la distribution du sang dans les tissus en fonction du contexte (hiérarchisation dépendant de la nature des organes...) et des besoins métaboliques du moment (M.J. MULVANY, "The structure of the resistance vasculature in essential hypertension", J. Hypertens., 1987, 5:129:H; H.A.J. STRUIJKER BOUDIER et coll., "The microcirculation and hypertension", J. Hypertens., 1992, 10 (suppl. 7):S147-S156).

De très nombreuses substances vaso-actives ont été identifiées, avec un intérêt tout particulier au cours de ces dernières années pour, à titre d'exemple, des substances d'origine ou à effet sur les fibres musculaires lisses et l'endothélium vasculaire (S. LAURENT et coll., "Physiopathologie et pharmacologie du remodelage artériel dans l'hypertension artérielle", La lettre du pharmacologue, 1997, 11:146-54; TADDEI et coll., "Hypertension causes prematurate aging of endothelial function in humans", Hypertension, 1997, 29:736-43).

La complexité de ces différentes régulations, le nombre de facteurs mis en jeu, leur interactivité aujourd'hui mieux comprise nous ont conduit à proposer la combinaison de plusieurs médicaments directement ou indirectement vaso-actifs pour à la fois prévenir et traiter :

- d'une part, l'atteinte clinique, l'hypertension artérielle par exemple, lorsque l'élévation des chiffres tensionnels atteint, voire dépasse, les normes recommandées par la Communauté Scientifique Internationale;
- d'autre part, son retentissement sur la perfusion tissulaire dans le cadre de désordres macro/microcirculatoires qui, on le sait, peuvent précéder, entretenir et aggraver l'entité clinique précédemment décrite à titre d'exemple (l'hypertension artérielle, mais aussi, par exemple, les complications vasculaires de certaines maladies métaboliques...) (H.A.J. STRUIJKER-BOUDIER et coll., "Assessment of the microcirculation in cardiovascular disease", Clin. Sci., 1996, 91:131-9).

5

15

20

L'action de différentes substances vaso-actives peut donc se compléter utilement, et fournir un effet thérapeutique amélioré pour le traitement de fond des maladies vasculaires dégénératives, voire pour la prévention des incidents et accidents qu'elles induisent.

On sait aussi que certains IEC ont un effet bénéfique sur la microcirculation artériolaire ou coronarienne, mais à aucun moment il n'a été démontré dans la littérature d'effet bénéfique sur l'unité fonctionnelle que représente une artériole et les capillaires adjacents.

Or, il a été montré, ce qui est l'objet de la présente invention, que la combinaison d'un IEC avec un diurétique, en dehors des propriétés connues de cette association, permettait de façon surprenante de corriger les désordres microcirculatoires à la fois au niveau artériolaire et capillaire alors qu'aucune propriété de cet ordre n'a jamais été ni décrite ni revendiquée dans les publications ou brevets antérieurs relatifs à des combinaisons, en particulier d'IEC et de diurétiques, aux IEC ou aux diurétiques.

Ce type de combinaison d'agents vaso-actifs trouve en plus son originalité dans le fait, en particulier, que chacun des constituants de la combinaison est le plus souvent utilisé à des doses faibles, généralement inférieures à celles utilisées dans chacun de leurs indications princeps.

Ce type d'association trouve donc son utilité dans l'obtention de compositions pharmaceutiques utiles pour le traitement des désordres microcirculatoires artériolo-capillaires. Ces compositions peuvent donc être utilisées dans toutes les pathologies où des désordres microcirculatoires interviennent comme par exemple les maladies vasculaires dégénératives, l'hypertension

artérielle, l'insuffisance cardiaque, l'ischémie cérébrale, les accidents coronariens, l'artérite des membres inférieurs, la prévention et le traitement des complications cardiovasculaires du diabète de type II, les rétinopathies, les néphropathies, etc... et cela en traitement principal ou secondaire.

Les IEC utilisables dans ces compositions sont, à titre non limitatif : le Perindopril, le Captopril, l'Enalapril, le Lisinopril, le Delapril, le Fosinopril, le Quinapril, le Ramipril, le Spirapril; l'Imidapril, le Trandolapril, le Benazepril, le Cilazapril et le Temocapril, et leurs sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptable.

5

10

15

20

25

Les IEC préférés sont le Perindopril, le Captopril, l'Enalapril, le Lisinopril, le Benazapril, le Quinapril et le Delapril et leurs sels et plus spécialement le Perindopril et ses sels.

Les diurétiques utilisables dans ces compositions sont, à titre non limitatif: l'Indapamide, l'Hydrochlorothiazide, le Furosemide, l'Altizide, le Trichlorméthiazide, le Triflumethazide, le Bemetizide, le Cyclothiazide, le Methylclothiazide, l'Azosemide, le Chlorothiazide, le Butizide, le Bendrofluazide, le Cyclopenthiazide, le Benzchlortriazide, le Polythiazide, l'Hydroflumethazide, le Benzthiazide, l'Ethiazide, le Penflutazide, la Clopamide, la Ciclétamide ou le Pirétanide, et leurs sels d'addition à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptable.

Les diurétiques préférés sont l'Indapamide et l'Hydrochlorothiazide et leurs sels et plus spécialement l'Indapamide et ses sels.

L'invention concerne donc plus préférentiellement l'utilisation d'une combinaison de l'inhibiteur d'enzyme de conversion Perindopril ou de l'un de ses sels d'addition à une base pharmaceutiquement acceptable et du diurétique Indapamide pour l'obtention de compositions pharmaceutiques destinées au traitement des désordres microcirculatoires artériolo-capillaires.

Les compositions pharmaceutiques selon l'invention seront présentées sous des formes pharmaceutiques convenant pour l'administration par voie orale, parentérale et notamment intraveineuse, per ou transcutanée, nasale, rectale, perlinguale, oculaire, respiratoire et plus spécifiquement les comprimés, les comprimés sublinguaux, les gélules, les glossettes, les capsules, les tablettes, les préparations injectables, les aérosols, les gouttes oculaires ou nasales, les suppositoires, les crèmes, pommades, gels dermiques, etc...

La voie d'administration préférée est la voie orale et les compositions pharmaceutiques correspondantes permettant la libération instantanée ou différée des principes actifs.

Les compositions pharmaceutiques préférées sont les comprimés.

5

10

20

Dans les compositions pharmaceutiques selon l'invention, les quantités d'IEC et de diurétique sont adaptées à la nature de ces principes actifs et leurs proportions relatives sont donc variables en fonction des principes actifs.

Lorsque l'IEC est le Perindopril sous forme de sel de tert-butylamine et que le diurétique est l'Indapamide, ces proportions sont respectivement comprises entre 65 et 85 % et entre 35 et 15 % de la masse totale des principes actifs et préférentiellement compris entre 70 et 80 % pour l'IEC et entre 30 et 20 % pour le diurétique.

Les pourcentages préférés pour cette combinaison sont 76 % de sel de tert-butylamine de Perindopril et 24 % d'Indapamide.

Les compositions selon l'invention, outre les principes actifs, contiennent un ou plusieurs véhicules ou excipients pharmaceutiquement acceptables.

Parmi les excipients pharmaceutiquement acceptables, on peut citer à titre non limitatif, les liants, les délitants, les délitants, les stabilisants, les conservateurs, les lubrifiants, les odorants, les aromatisants ou les édulcorants.

La posologie varie selon l'âge et le poids du patient, la voie d'administration, la nature de l'indication thérapeutique et des traitements associés. Elle s'échelonne entre 1 et 50 mg selon la nature de l'IEC et entre 0,5 et 25 mg selon la nature du diurétique en une ou plusieurs prises par 24 heures.

Exemples de compositions pharmaceutiques selon l'invention. Les exemples sont données à titre non limitatif.

**EXEMPLE 1** : Comprimés de Perindopril / Indapamide

Constituants	Quantité (mg)	
Perindopril, sel de tert-butylamine	2	
Indapamide	0,625	
Silice colloïdale hydrophobe	0,25	
Lactose	64,175	
Stéarate de magnésium	0,45	
Cellulose microcristalline	22,5	
Pour un comprimé terminé à	90	

# EXEMPLE 2:

Constituants	Quantité (mg)
Perindopril, sel de tert-butylamine	4
Indapamide	1,25
Silice colloïdale hydrophobe	0,25
Lactose	61,55
Stéarate de magnésium	0,45
Cellulose microcristalline	22,5
Pour un comprimé terminé à	90

# 5 **EXEMPLE 3**:

Constituants	Quantité (mg)
Captopril	50
Hydrochlorothiazide	25

# **EXEMPLE 4**:

Constituants	Quantité (mg)
Enalapril, maléate	20
Hydrochlorothiazide	12,5

# EXEMPLE 5:

Constituants	Quantité (mg)
Lisinopril	20
Hydrochlorothiazide	12,5

# EXEMPLE 6:

Constituants	Quantité (mg)
Benazepril, chlorhydrate	10
Hydrochlorothiazide	12,5

# 5 **EXEMPLE 7**:

Constituants	Quantité (mg)
Quinapril, chlorhydrate	20
Hydrochlorothiazide	12,5

# EXEMPLE 8:

Constituants	Quantité (mg)
Perindopril, sel de tert-butylamine	2
Hydrochlorothiazide	12,5

# EXEMPLE 9:

Constituants	Quantité (mg)
Perindopril, sel de tert-butylamine	4
Hydrochlorothiazide	25

EXEMPLE 10:

Constituants	Quantité (mg)
Captopril	50
Indapamide	1,25

### EXEMPLE 11:

Constituants	Quantité (mg)
Enalapril, maléate	20
Indapamide	1,25

# EXEMPLE 12:

Constituants	Quantité (mg)
Lisinopril	20
Indapamide	1,25

# 5 **EXEMPLE 13**:

Constituants	Quantité (mg)
Benazépril, chlorhydrate	10
Indapamide	1,25

### EXEMPLE 14:

Constituants	Quantité (mg)
Quinapril, chlorhydrate	20
Indapamide	1,25

# EXEMPLE 15:

Constituants	Quantité (mg)	
Perindopril, sel de tert-butylamine	4	
Bendrofluazide	5	

EXEMPLE 16:

Constituants	Quantité (mg)
Captopril	50
Bendrofluazide	5

#### EXEMPLE 17:

Constituants	Quantité (mg)
Delapril, chlorhydrate	30
Indapamide	2,5

#### **EXEMPLE 18:**

Constituants	Quantité (mg)
Delapril, chlorhydrate	30
Hydrochlorothiazide	25

#### **EXEMPLE 19:**

20

Constituants	Quantité (mg)
Fosinopril	10
Hydrochlorothiazide	25

#### Etude pharmacologique des compositions selon l'invention

Effets de la combinaison du sel de tert-butylamine de Perindopril (0,76 mg/kg/j, PO) + Indapamide (0,24 mg/kg/j, PO), chez le rat hypertendu réno-vasculaire 1R-1C : Aspect hémodynamique et études de la densité artériolo-capillaire sous endocardique.

- Des rats Wistar âgés de 8 semaines (n = 56; poids corporel = 200 g) ont subi dans un premier temps la pose d'un clip (diamètre 0,2 mm) sur l'artère rénale gauche et quatre jours plus tard, une néphrectomie controlatérale était effectuée. Une série de rats identiques (n = 13) a subi les mêmes interventions (anesthésie + chirurgie) mais sans sténose de l'artère rénale ni néphrectomie (groupe contrôle NT). Les rats Goldblatt 1R-1C ont reçu:
- soit une alimentation normale : groupe contrôle HT;
  - soit une alimentation contenant du sel de tert-butylamine de perindopril (0,76 mg/kg/jour) et de l'indapamide (0,24 mg/kg/jour) : groupe HT + combinaison.

Les effectifs de chaque groupe ont été ajustés, en tenant compte de la mortalité spécifique dans chaque groupe de manière à pouvoir analyser, après 4 semaines de traitement, au moins 9 animaux par groupe.

	Effectifs opérés	Analysés (survivants)
Contrôle NT	13	13
Contrôle HT	21	9
HT + combinaison Perindopril-Indapamide	- 18	. 10

Après 4 semaines de traitement, on enregistrait sous anesthésie les paramètres hémodynamiques (Table I), puis on prélevait le coeur pour analyse histomorphométrique quantitative.

La combinaison sel de Perindopril-Indapamide diminuait significativement la pression artérielle (p<0,01). Les débit et fréquence cardiaques n'étaient pas modifiés par le traitement.

Le degré d'hypertrophie ventriculaire gauche (poids du VG/poids corporel) était significativement diminué par rapport au groupe contrôle HT (p<0,001).

Tableau I

	Contrôle NT	Contrôle HT	HT + combinaison
Pressions artérielles systoliques (mmHg)	138 ± 5	209 ± 12	110 ± 19
Pressions artérielles diastolique (mmHg)	110 ± 5	146 ± 11	79 ± 12
Débit cardiaque (ml/min)	59 ± 4	45 ± 4	63 ± 7
Fréquence cardiaque (/min)	$486 \pm 10$	455 ± 19	496 ± 11
Poids VG/Poids corporel (mg/g)	2,1 ± 0,1	$3,7 \pm 0,2$	2,2 ± 0,2

# Densité capillaire sous endocardique dans la paroi du ventricule gauche

5

15

La densité capillaire était significativement diminuée dans le groupe contrôle HT par rapport au groupe contrôle NT (p<0,05) et normalisée par la combinaison sel de Perindopril-Indapamide.

# Densité artériollaire sous endocardique dans la paroi du ventricule gauche

Le nombre d'artérioles par mm² de surface sous endocardique était significativement augmenté dans le groupe contrôle HT (p<0,05) et normalisé dans le groupe combinaison sel de Perindopril-Indapamide.

Les résultats sont présentés dans le tableau II.

10

#### Tableau II

(n/mm²)	Contrôle NT	Contrôle HT	HT + Combinaison
Densite capillaire sous endocardique	1030 ± 42	916 ± 39	1076 ±41
Densité artériollaire sous endocardique	8,25 ± 0,46	10,51 ± 0,41	8,96 ± 0,63

On peut donc interpréter les données qui précèdent de la façon suivante :

- Il se confirme qu'il existe dans la plupart des maladies vasculaires dégénératives, ici dans l'hypertension artérielle, des altérations anatomiques et/ou fonctionnelles de la microcirculation artériolo-capillaire.
  - Dans l'expérience ici réalisée, l'anomalie la plus nette concerne la densité capillaire fortement diminuée chez les hypertendus, et normalisée sous l'effet du "traitement" par la combinaison de ces deux principes actifs.
  - La part respective de l'effet de chacun des constituants de l'association sur les artérioles et les capillaires est, compte tenu des conditions de réalisation de l'expérience, difficile à définir. Il semble cependant que chacun des constituants ait un rôle à la fois sur la composante artériolaire et la composante capillaire de l'unité fonctionnelle microcirculatoire.
- En conclusion, le fait de combiner le sel de Perindopril et l'Indapamide, dans les proportions 76-24 %, normalise les densités capillaire et artéiolaire sous endocardiques, étudiées ici pour illustrer l'invention.

#### REVENDICATIONS

- 1/ Utilisation d'une combinaison d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et d'un diurétique pour l'obtention de compositions pharmaceutiques destinées au traitement des désordres microcirculatoires artériolo-capillaires.
- 2/ Utilisation selon la revendication 1 caractérisée en ce que l'inhibiteur d'enzyme de 5 conversion est le Perindopril, le Captopril, l'Enalapril, le Lisinopril, le Delapril, le Fosinopril, le Quinapril, le Ramipril, le Spirapril, l'Imidapril, le Trandolapril, le Benazepril, le Cilazapril ou le Temocapril et que le diurétique est l'Indapamide, l'Hydrochlorothiazide, le Furosemide, l'Altizide, le Trichlorméthiazide, le Triflumethazide, le Bemetizide, le Cyclothiazide, le Methylclothiazide, l'Azosemide, le Chlorothiazide, le Butizide, le 10 Bendrofluazide. Cyclopenthiazide, le Benzchlortriazide, le Polythiazide, l'Hydroflumethazide, le Benzthiazide, l'Ethiazide, le Penflutazide, la Clopamide, la Ciclétamide ou le Pirétanide, ainsi que les sels d'addition de ces composés à un acide ou une base pharmaceutiquement

15

20

acceptable.

- 3/ Utilisation selon la revendication 2 caractérisée en ce que l'inhibiteur d'enzyme de conversion est le Perindopril, le Captopril, l'Enalapril, le Lisinopril, le Benazepril, le Quinapril ou le Delapril et que le diurétique est l'Indapamide ou l'Hydrochlorothiazide ainsi que les sels d'addition de ces composés à un acide ou à une base pharmaceutiquement acceptable.
- 4/ Utilisation d'une combinaison de l'inhibiteur d'enzyme de conversion Perindopril ou de l'un de ses sels d'addition à une base pharmaceutiquement acceptable et du diurétique Indapamide pour l'obtention de compositions pharmaceutiques destinées au traitement des désordres microcirculatoires artériolo-capillaires.
- 5/ Utilisation selon la revendication 4 caractérisée cn ce que l'inhibiteur d'enzyme de conversion est le sel de tert-butylamine de Perindopril et que le diurétique est l'Indapamide.

- 6/ Utilisation selon la revendication 4 caractérisée en ce que les compositions pharmaceutiques renferment des quantités de sel de tert-butylamine de Perindopril et d'Indapamide respectivement comprises entre 65 et 85 % et entre 35 et 15 % de la masse totale des principes actifs.
- 5 7/ Utilisation selon la revendication 6 caractérisée en ce que ces quantités sont 76 % de sel de tert-butylamine de Perindopril et 24 % d'Indapamide.
  - 8/ Utilisation selon la revendication 1 caractérisée en ce que les compositions pharmaceutiques se présentent sous la forme de comprimés.
  - 9/ Utilisation selon la revendication 4 caractérisée en ce que les compositions pharmaceutiques se présentent sous la forme de comprimés.

- 10/ Composition pharmaceutique convenant pour l'utilisation selon la revendication 9 caractérisée en ce que le comprimé contient 2 mg de sel de tert-butylamine de Perindopril et 0,625 mg d'Indapamide ainsi que des excipients ou véhicules inertes non toxiques pharmaceutiquement acceptables.
- 15 11/ Composition pharmaceutique convenant pour l'utilisation selon la revendication 9 caractérisée en ce que le comprimé contient 4 mg de sel de tert-butylamine de Perindopril et 1,25 mg d'Indapamide ainsi que des excipients ou véhicules inertes non toxiques pharmaceutiquement acceptables.

In ational Application No PCT/FR 98/00411

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 A61K38/55 //(A61K38/55,31:405) According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 A61K Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. DATABASE BIOSIS 1-11 BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE. PHILADELPHIA, PA, US LUCCIONI R ET AL: "An equivalence study of the safety and efficacy of a fixed-dose combination of perindopril with indapamide versus fixed-dose combinations of captopril with hydrochlorothiazide and enalapril with hydrochlorothiazide in the treatment of hypertension" XP002071800 see abstract & JOURNAL OF HYPERTENSION, 13 (12 PART 2). 1995. 1847-1851... X Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. 'Special categories of cited documents: T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention filing date cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) " document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of theinternational search Date of mailing of the international search report 16 July 1998 29/07/1998 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Leherte, C

In. .tional Application No
PCT/FR 98/00411

	lation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
ategory	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	DATABASE BIOSIS BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE, PHILADELPHIA, PA, US CHALMERS J ET AL: "Blood pressure lowering for the secondary prevention of stroke: Rationale and design for PROGRESS" XP002071801	1-11
	see abstract & JOURNAL OF HYPERTENSION, 14 (SUPPL. 2). 1996. S41-S46.,  DATABASE BIOSIS BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE, PHILADELPHIA, PA, US	1-11
	CHALMERS J ET AL: "Progress-perindopril protection against recurrent stroke study: Status in July 1996" XP002071802 see abstract & JOURNAL OF HYPERTENSION, 14 (SUPPL. 6). 1996. S47-S51.,	
(	DATABASE BIOSIS BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE, PHILADELPHIA, PA, US NEAL B ET AL: "Blood pressure lowering in patients with cerebrovascular disease: Results of the PROGRESS (perindopril protection against recurrent stroke study) pilot phase" XPO02071803 see abstract & CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY, 23 (5). 1996. 444-446.,	1-11
	DATABASE MEDLINE US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM), BETHESDA, MD, US WHITLOCK G ET AL: "Blood pressure lowering for the prevention of cognitive decline in patients with cerebrovascular disease. PROGRESS Management Committee. Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study." XP002071804 see abstract & CLIN EXP HYPERTENS, JUL-AUG 1997, 19 (5-6) P843-55, UNITED STATES,	1-11
	see abstract & CLIN EXP HYPERTENS, JUL-AUG 1997, 19	

Int tional Application No PCT/FR 98/00411

<u> </u>		PCT/FR 98	3/00411
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to daim No.
<b>X</b>	DATABASE MEDLINE US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM), BETHESDA, MD, US NEAL B ET AL: "PROGRESS (perindopril protection against recurrent stroke study): rationale and design. PKOGRESS Management Committee 'corrected!		1-11
	'published erratum appears in J Hypertens 1996 Apr:14(4):535!" XP002071805 see abstract & J HYPERTENS, DEC 1995, 13 (12 PT 2) P1869-73, ENGLAND,		
x	WO 93 17685 A (MERCK & CO INC) 16 September 1993 see claims	·	1-3
X	WO 96 28185 A (PFIZER ;CROPP ANNE B (US); KRASKA ALLEN R (US)) 19 September 1996 see claims		1-11
	<del></del> .		

Information on patent family members

Int. Jonal Application No PCT/FR 98/00411

Patent document cited in search repor	t	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 9317685	A	16-09-1993	AU	686097 B	05-02-1998
			CA	2130577 A	16-09-1993
			DK	9200258 U	23-07-1993
			ΕP	0643580 A	22-03-1995
			ES	2083931 T	01-05-1996
			JP	7504659 T	25-05-1995
			NO	943353 A	09-09-1994
			NZ	249773 A	26-01-1996
			US	5686451 A	11-11-1997
			ZA	9301714 A	30-09-1993
WO 9628185	Α	19-09-1996	CA	2215234 A	19-09-1996
			EP	0804229 A	05-11-1997
			FΙ	973691 A	15-09-1997

De de Internationale No PCT/FR 98/00411

CIB 6	EMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE A61K38/55 //(A61K38/55.31:405)		-
Selon la cla	issification internationale des brevets (CIB) ou a la fois selon la classific	entine antiomic at la CID	
	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE	:ation nationale et la Cis	
	ation minimale consultée (système de classification suivi des symboles d	de classement)	
CIB 6	A61K		
		2	
Documenta	ation consultée autre que la documentationminimale dans la mesure où	ces documents relèvent des domaines si	ur lesquels a porté la recherche
Base de do utilisés)	nnees électronique consultée au cours de la recherche internationale (	nom de la base de donnees, et si cela est	realisable, termes de recherche
	•		
C BOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie ·	Identification des documents cités, avec le cas echeant. l'indicatione	toe naceanos nortinonts	no. des revendications visées
	33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	es hassades herraerro	no. des revendications visees
Х	DATABASE BIOSIS		1-11
	BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE,		
	PHILADELPHIA, PA, US	-4d., a.C	
	LUCCIONI R ET AL: "An equivalence the safety and efficacy of a fixed		
	combination of perindopril with in	ndapamide	
	versus fixed-dose combinations of	•	
	captopril with hydrochlorothiazide enalapril with hydrochlorothiazide		
	treatment of hypertension"	: III the	
	XP002071800		
	Voir abrégé	DADT O	
	& JOURNAL OF HYPERTENSION, 13 (12 1995. 1847-1851	PARI 2).	
	-/	/	
X Voir	la suite du cadre C pour la finde la tiste des documents	Les documents de familles de bre	vets sont indiqués en annexe
' Catégories	s spéciales de documents cités:	F* document ulterieur publié après la date	de dépôt international ou la
	ent définissant l'état général de latechnique, non lére comme particulièrement pertinent	date de priorité et n'appartenenant pa technique pertinent, mais cité pour co	mprendre le principe
E, qocriwe	ent antérieur, mais publié à la date dedépôt international	ou la théorie constituant la base del'ir C' document particulièrement pertinent; i'	
"L" docume	ent pouvant jeter un doute sur une revendcation de	être considérée comme nouvelle ou c inventive par rapport au document co	omme impliquant une activité
autre d	andian of pour time ration speciale fresh do morquee)	document particulièrement pertinent; l' ne peut être considérée comme implie	invention revendiquée
	ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à rposition ou tous autres moyens	lorsque le document est associé à un documents de même nature, cette co	ou plusieurs autres
"P" docume posteri	ent publié avant la date de dépôtinternational, mais leurement à la date de priorité revendiquée *8	pour une personne du métier 3° document qui fait partie de la même fa	millede brevets
	elle la recherche internationale a étéeffectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport d	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
,			
10	6 juillet 1998	29/07/1998	
Nom et adre	isse postale de l'administrationchargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autorisé	
	Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk		
	Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Leherte, C	

DDLD ide Internationale No PCT/FR 98/00411

C.(suite) D	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	PCT/FR 9	
Catégorie	Identification des documents cités. avec le cas échéant. l'indicationdes passages p	ertinents	no. des revendications visees
X	DATABASE BIOSIS BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE, PHILADELPHIA, PA, US		1-11
	CHALMERS JET AL: "Blood pressure lowering for the secondary prevention of stroke: Rationale and design for PROGRESS"  XP002071801		
	voir abrégé & JOURNAL OF HYPERTENSION, 14 (SUPPL. 2). 1996. S41-S46.,		
	DATABASE BIOSIS BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE, PHILADELPHIA, PA, US CHALMERS J ET AL: "Progress-perindopril		1-11
	protection against recurrent stroke study: Status in July 1996" XP002071802 voir abrégé & JOURNAL OF HYPERTENSION, 14 (SUPPL. 6).		
	1996. S47-S51.,  DATABASE BIOSIS BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE, PHILADELPHIA, PA, US NEAL B ET AL: "Blood pressure lowering in		1-11
3	patients with cerebrovascular disease: Results of the PROGRESS (perindopril protection against recurrent stroke study) pilot phase" XP002071803 voir abrégé		
	& CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY, 23 (5). 1996. 444-446.,		
	DATABASE MEDLINE US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM), BETHESDA, MD, US WHITLOCK G ET AL: "Blood pressure lowering for the prevention of cognitive decline in patients with cerebrovascular disease. PROGRESS Management Committee. Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study."		1-11
	XP002071804 voir abrégé & CLIN EXP HYPERTENS, JUL-AUG 1997, 19 (5-6) P843-55, UNITED STATES,		
	-/		

De de Internationale No PCT/FR 98/00411

		PCI/FR 9	98/00411		
C.(suite) De	(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS  atégorie   Identification des documents cités, avec,le cas échéant, l'indicationdes passages pertinents no, des revendications visé				
	passages p		no. des revenuications visees		
	DATABASE MEDLINE US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM), BETHESDA, MD, US NEAL-B ET AL: "PROGRESS (perindopril protection against recurrent stroke study): rationale and design. PROGRESS Management Committee 'corrected! 'published erratum appears in J Hypertens 1996 Apr;14(4):535!"	* <b>-</b> .	1-11		
	XP002071805 voir abrégé & J HYPERTENS, DEC 1995, 13 (12 PT 2) P1869-73, ENGLAND,				
: 	WO 93 17685 A (MERCK & CO INC) 16 septembre 1993 voir revendications		1-3		
(	WO 96 28185 A (PFIZER ;CROPP ANNE B (US); KRASKA ALLEN R (US)) 19 septembre 1996 voir revendications		1-11		

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

D ide Internationale No PCT/FR 98/00411

		j.			
Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
WO 9317685	Α	16-09-1993	AU	686097 B	05-02-1998
			CA	2130577 A	16-09-1993
			DK	9200258 U	23-07-1993
			EP	0643580 A	22-03-1995
			ES	2083931 T	01-05-1996
		-	יין די	7504659 T	25-05-1995
			NO	943353 A	09-09-1994
			NZ	249773 A	26-01-1996
			US	5686451 A	11-11-1997
			ZA	9301714 A	30-09-1993
WO 9628185	A	19-09-1996	CA	2215234 A	19-09-1996
			EP	0804229 A	05-11-1997
			FI	973691 A	15-09-1997